

# pijnbestrijding

## blokkade ganglion C2



### Blokkade ganglion C2

Bij hoofd- en aangezichtspijn kan een zenuw aan de achterzijde van de eerste en tweede nekwerfel verantwoordelijk zijn voor de klachten. Vooral bij verschillende vormen van migraineachtige hoofdpijn, spanningshoofdpijn en aangezichtspijn kan deze zenuw een rol spelen bij het ontstaan van de klachten. Er is een behandeling van deze zenuw mogelijk om deze klachten te verminderen.

### De dag van de behandeling

U meldt zich bij de receptie. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U neemt, eventueel met uw begeleider, plaats in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent wordt u naar de behandelkamer gebracht. In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Rekent u op een verblijf van ongeveer een uur.

### De behandeling

U gaat op een smalle behandeltafel liggen. Met behulp van röntgen-doorlichting wordt een dunne naald geplaatst. Vervolgens wordt de zenuw met radiofrequente stroom behandeld waardoor er een langdurig effect optreedt. In een aantal gevallen wordt een verdovend en een ontstekingsremmend medicijn ingespoten. De behandeling duurt ongeveer tien minuten. Na de behandeling wordt u op een bed op de uitslaapkamer gelegd. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

dermatologie

flebologie  
vaatchirurgie

gynaecologie

interne  
geneeskunde

ortho-  
paedie

oog-  
heelkunde

pijn-  
bestrijding

plastische  
chirurgie

uro-  
logie



Stichting Medisch Centrum  
**JAN VAN GOYEN**

## Resultaat van deze behandeling

Na de behandeling kunt u de eerste 2 weken een tijdelijke verergering van de pijnklachten krijgen. U kunt eventueel pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Daarna horen de klachten af te nemen. Pas na enkele weken tot wel 2 maanden kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect merkt, maar soms moet de behandeling juist herhaald worden.

## Complicaties/bijwerkingen

Na een blokkade van het ganglion C2 kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:

- Tijdelijk een dof gevoel van de huid op de plek van de behandeling.
- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeding ontstaan. Dit veroorzaakt soms wat pijn.

Door het ontstekingsremmende medicijn:

- Kunnen bij vrouwen opvliegers optreden en kan de menstruatie verstoord worden.
- Kunnen bij suikerpatiënten de bloedsuikerwaarden gaan schommelen.

## Voorzorgsmaatregelen

Indien één van de onderstaande punten op u van toepassing is, verzoeken wij u dit voor de behandeling te overleggen met uw behandelende pijnspecialist.

- U bent mogelijk zwanger.
- U bent allergisch of overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters.
- U gebruikt bloedverdünnende medicijnen.

Sommige bloedverdunners horen voor de behandeling tijdelijk gestopt te worden vanwege het risico van een bloeding. Overleg dit altijd tevoren met uw pijnspecialist! Zo dient bijvoorbeeld Marcoumar 5 dagen en Sintrom 3 dagen voor de behandeling gestaakt te worden. Na de behandeling kunt u deze geneesmiddelen hervatten volgens het voorschrift van de trombosedienst.

## Belangrijk

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

## Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust. U kunt ons van maandag t/m vrijdag bellen op 020 - 305 58 09.

U kunt ook een e-mail sturen naar [pijnbestrijding@jvg.nl](mailto:pijnbestrijding@jvg.nl).

## Tot slot

We doen er alles aan uw bezoek aan de polikliniek Pijnbestrijding van het Medisch Centrum Jan van Goyen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Als u niet geheel tevreden bent horen we dit graag. Wanneer u een klacht heeft, kunt u zich richten tot ons klachten- en bemiddelingsbureau. De medewerkers zijn aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en kunt u bereiken via 020 - 305 58 82. U kunt ook een e-mail sturen naar [klachtenbehandeling@jvg.nl](mailto:klachtenbehandeling@jvg.nl).