

SCLEROSEREN

Spataderen zijn bloedvaten die door slecht sluitende klepjes niet meer goed functioneren of verwijd zijn geraakt. Omdat ze pijnklachten, eczeem of uiteindelijk een open been kunnen veroorzaken, is het beter spataderen te verwijderen. Dit kan onder andere door het inspuiten van spataderen. Dit heet scleroseren.

Bij het scleroseren van spataderen brengt de dermatoloog een dunne naald in het bloedvat. Daarna spuit de dermatoloog een vloeistof in. Hiermee wordt opzettelijk de wand van het bloedvat beschadigd, zodat deze zal verkleven en het vat verandert in een dunne streng waar geen bloed meer doorheen stroomt. Meestal behandelt de dermatoloog één been per behandeling.

Belangrijk:

Neem de speciale kousen mee anders gaat de behandeling niet door!

Tijdens uw vorige bezoek heeft u het recept of formulier gekregen voor de kousen die u na de behandeling moet dragen. De kousen zijn nodig om na de ingreep de behandelde spataderen plat te drukken en te laten verkleven.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Via een dunne naald in de spatader spuiten we een speciale vloeistof in. Bij deze behandeling laten we expres een soort ontsteking ontstaan. We beschadigen daarvoor de wand van het bloedvat. Door de ontsteking gaat de wand verkleven. De ader verandert daarna in een dunne draad waar geen bloed meer doorheen stroomt. U merkt weinig van de behandeling. Wij vragen u steeds of u iets voelt. In het algemeen geldt:

- Dat u een lichte, wat brandende pijn voelt bij het inspuiten van kleine spataderen. Dit is normaal!
- Van het inspuiten van de grotere spataderen voelt u niets
- Na het inspuiten plakken we wattenbollen op de inspuitplaatsen en doen we u de speciale kousen aan.

Na de behandeling

- Soms krijgt u na een paar dagen op de plek van de spatader een rode plek, een zwelling of pijn. De meeste patiënten hebben hier weinig of geen last van.
- Bij behandeling van meerdere spataders tegelijk of behandeling van een grote spatader kunt u meer last krijgen. De klachten kunnen enkele dagen aanhouden. U mag dan een paracetamol nemen.
- Na de inspuiting moet u 20 minuten wandelen om de vloeistof goed te verdelen over het vat.
- Na verwijderen van kous en wattenbollen zijn de spuitplekken vaak blauw. Het duurt soms maanden voordat de verkleuring weg is.

Tip: zorg dat u paracetamol in huis heeft! Dit is verkrijgbaar drogist of apotheek.

Hoelang moet ik de kous dragen?

- U draagt de kous de eerste 48 uur dag en nacht.
- Afhankelijk van het soort spatader draagt u de kous daarna nog 5 tot 12 dagen.
- Voor een goede wondgenezing is het belangrijk om kous en pleisters droog te houden.

Complicaties

Geen enkele behandeling is zonder risico's. Zo bestaat ook bij sclerocom-pressietherapie een heel kleine kans op complicaties zoals:

- blaartjes of wondjes op de spuitplek
- pijnlijk bloedstolsel (oppervlakkige trombose) in het vat.
- allergische reactie op de ingespoten vloeistof
- soms blijven pigmentvlekken achter of een roodpaarse vlek van zeer fijne haarvaatjes (matting).
- pijn, blaartjes of striemen in de knieholten als daar is ingespoten

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dermatologie:

Locatie Jan van Goyenkade
Jan van Goyenkade 1
1075 HN Amsterdam
020 – 305 58 45

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur.